



PŘINÁŠÍME NOVÉ I OSVĚDČENÉ MOŽNOSTI ÚČINNÉ FUNGICIDNÍ OCHRANY OBILNIN

Vážení pěstitelé obilnin,

porosty sloupkujících obilnin jsou v různé míře napadeny padlím, braničnatkami a rzemi. Infekce houbových patogenů včetně chorob pat stébel v porostech jsou a může dojít k jejich masivnímu rozvoji. Zejména braničnatek je více než v loňském roce. Věnujte pozornost signalizaci a kontrolujte své porosty a ošetřete včas.

Hutton®

Osvědčený univerzální a komplexní fungicid velmi vhodný pro ošetření v tomto období proti braničnatkám.

Obilniny: pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves

Termín aplikace: BBCH 37–59 (ječmen BBCH 30–47)

Dávkování: 0,6–0,8 l/ha při výskytu padlí, časných infekcí chorob a skvrnitostí ječmene
0,8 l/ha při výskytu braničnatek, padlí, rzí
1 l/ha při velmi silném výskytu chorob a DTR

V porostech aplikujte nižší dávku 0,6 l/ha proti padlí preventivně nebo co nejdříve po zjištění příznaků. V porostech, které nevyžadují okamžitý zásah, aplikujte až v dalším průběhu sloupkování 0,8–1 l/ha. Hutton® rychle a efektivně zastavuje vývoj chorob.

Hutton® FORTE

Všestranný fungicid inspirovaný praxí pro dlouhodobou fungicidní ochranu s podporou vitality rostlin.

Obilniny: pšenice, ječmen, žito, tritikale

Termín aplikace: BBCH 30–69 (ječmen BBCH 30–61)

Dávkování: 1,5 l/ha

Hutton® Forte lze aplikovat v širokém intervalu od začátku sloupkování do konce kvetení, v ječmeni do začátku kvetení. Fungicid je určen pro ochranu listových pater, praporcového listu, popřípadě současně i klasu (termín T2). Při výskytu ranných infekcí padlí a listových chorob je možné použít v termínu T1. Při aplikaci v pozdější růstové fázi (termín T3) velmi dobře působí proti klasovým fuzáriím. Pro dosažení maximální účinnosti a reziduálního působení použijte dávku 1,5 l/ha.

V případě nižšího výskytu a tlaku chorob nebo ve sledu s dalšími fungicidy, je možné dávku snížit na 1,3 l/ha.



PRO VÝRAZNÝ NÁSKOK PŘED CHOROBAMI



**Dlouhodobá fungicidní ochrana
pro střední a vyšší intenzitu**

Obilniny: pšenice, ječmen, žito, tritikale

Choroby: stéblolam, braničnatky, rzi, padlí, DTR, skvrnitosti ječmene

Dávkování: 0,9–1,2 l/ha

Preventivní, kurativní, eradikativní účinek spojený s reziduálním působením umožňuje aplikovat Boogie® Xpro od odnožování až do konce metání. Vyřešíte stéblolam (choroby pat stébel), padlí, rzi a listové skvrnitosti včetně braničnatek a DTR. Xpro™ technologie má navíc pro obilniny stimulační a fyziologický anti-stresový účinek. Získáte časový náskok před chorobami a prodloužíte případný aplikační interval od dalšího ošetření.

Boogie® Xpro MAXIPack

sleva 5 %



Naše fungicidy jsou optimálně nastaveny obsahem účinných látek pro vysokou účinnost a vzhledem k moderním formulačním technologiím poskytují přidanou hodnotu rostlinám v podobě podpory vitality.

Všechny zmíněné fungicidy jsou bez omezení v OP II. stupně ochrany podzemních a povrchových vod.

Slevy oproti nákupu přípravků samostatně jsou kalkulovány na základě doporučených cen společností Bayer pro konečného spotřebitele pro rok 2023.

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím náš technicko-poradenský servis

Bayer Team