

Scenic® Gold

Účinná látka

fluopikolid 200 g/l
fluoxastrobin 150 g/l

Kombinované fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva řepky olejky, hořčice, ředkve olejné, řepice olejné a hořčice sarepské proti houbovým chorobám.

Balení a hmotnost

HDPE kanystr 5 l

Působení přípravku

Scenic® Gold je základním prvkem fungicidní ochrany v počátečních fázích vývoje rostlin, podporuje kvalitu a rychlost vzcházení. Zaručuje vyváženou konkurenceschopnost jednotlivých rostlin, což je základem zdravého a vyrovnaného porostu. Zabraňuje šíření houbových patogenů do pozdějších růstových fází rostlin. Scenic® Gold byl vyvinut k ochraně řepky olejky a hořčice proti chorobám pocházejícím z osiva či z půdy. Jeho předností je účinnost i na rozšiřujícího se patogena plíseň zelnu již od počátku vegetace. Dále působí v období klíčení a vzcházení proti komplexu chorob způsobujících padání klíčnicích rostlin, proti fomové hnilobě a alternáriové skvrnitosti brukvovitých. Fluopicolide představuje novou chemickou skupinu (benzamidy) s novým způsobem účinku u něhož



nebyla zaznamenána cross rezistence na houby ze skupiny *Oomycetes*. Vyznačuje se konzistentní vysokou preventivní účinností, ale také antisporelačním efektem s kurativním účinkem.

Fluoxastrobin je širokospektrální fungicidní účinná látka ze skupiny strobilurinů. Působí kontaktně a částečně penetruje do ošetřeného osiva.

Nebyl zaznamenán negativní vliv při přeskladnění osiva.

Dávkování a doporučení pro aplikaci

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem platným pro daný typ aplikačního zařízení. Pro snížení prašnosti a dosažení optimální pokrývnosti doporučujeme aplikovat s Peridiam® Quality 208 nebo 009, zároveň se zaprašovadlem Fluency Powder proti spékání namořeného osiva, pro rovnoměrné pokrytí a barevnost.

Návod k použití

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	OL (dny)	Poznámka
Řepka olejka, hořčice	fomová hniloba brukvovitých, alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná, rhizoktoniová hniloba brukvovitých	1 l/100 kg	AT	výsevek 3–6 kg/ha

Návod k použití - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka	OL (dny)	Poznámka
Ředkev olejná, řepice olejná, hořčice sarepská	fomová hniloba brukvovitých, alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná, rhizoktoniová hniloba brukvovitých	1 l/100 kg	AT	výsevek 2,5–6 kg/ha